

4) нахожу, чему равно Z ;

5) комментирую через компоненты действий.

Следующий этап – решение уравнений вида: $a \cdot K = v$; $a : K = v$; $K : a = v$.

1 этап. Решение с одновременным комментированием правил нахождения площади прямоугольника и его сторон. Например, $K : \underline{2} = \underline{5}$ (K – площадь прямоугольника, 2 и 5 – его стороны).

$K = 2 \cdot 5$ (чтобы найти площадь прямоугольника, надо перемножить его стороны). $K = 10$.

2 этап. Решение уравнений с комментированием (через площадь прямоугольника и его стороны).

Комментирование через компоненты действий после решения уравнения.

Для отработки навыков решения уравнений на умножение и деление можно использовать следующие упражнения.

1. Выполни проверку и найди ошибку.

$$K : 2 = 4. \quad K = 4 : 2. \quad \underline{K = 2.}$$

Дети решают: $2 : 2 = 4$; $1 \neq 4$.

2. Проанализируй решение уравнения и найди ошибку.

$$K \cdot 3 = 9. \quad K = 3 \cdot 9. \quad K = 27.$$

Ошибки: 1) 9 – это площадь, целое, ее надо обозначить прямоугольником; 2) K – это сторона, надо площадь разделить на другую сторону.

3. Составь уравнения с числами 3, X , 12 и реши их.

Дети составляют: $12 : K = 3$; $3 \cdot K = 12$ и т. д.

4. Из данных уравнений реши те, которые решаются делением.

$$K \cdot 2 = 6; \quad K : 4 = 16; \quad 12 : K = 4.$$

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Салмина, Н. Г. Знак и символ в обучении / Н. Г. Салмина. – М., 1988.
2. Савин, А. П. Энциклопедический словарь юного математика / А. П. Савин. – М. : Педагогика, 2006. – 450 с.
3. Рудницкая, В. Н. Математика. 1–4 класс : учебник / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. – М. : Вентана-граф, 2016–2018.

А. И. БАСИК, Е. В. ГРИЦУК

Брест, Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ БрГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА (АНАЛИЗ)

На физико-математическом факультете БрГУ имени А. С. Пушкина 01.04.2021 проходила традиционная студенческая олимпиада по математике. В олимпиаде приняли участие 30 студентов факультета. Отметим победителей: дипломами первой степени награждены Е. В. Веренич (ПМ-11) и Т. А. Яцук (ПМ-31), дипломами второй степени – Д. В. Галуц (ПМ-11) и С. В. Савонюк (ПМ-11), дипломом третьей степени – А. В. Зарецкий (ФИ-11).

Ниже приводятся условия и решения задач по математическому анализу и обыкновенным дифференциальным уравнениям олимпиады (нумерация задач сохранена).

Задача 2. Числовая последовательность задана рекуррентно

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{3n+5}{3n+2}x_n + \frac{1}{3n+2}.$$

При каких $a \in \mathbf{R}$ последовательность x_n сходится?

Решение. Положим $y_n := \frac{x_n}{3n+2}$. Тогда

$$y_1 = \frac{a}{5}, \quad y_{n+1} = y_n + \frac{1}{(3n+5)(3n+2)}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} y_n &= y_1 + (y_2 - y_1) + (y_3 - y_2) + \dots + (y_{n-1} - y_{n-2}) + (y_n - y_{n-1}) = \\ &= \frac{a}{5} + \frac{1}{(3 \cdot 1 + 5)(3 \cdot 1 + 2)} + \frac{1}{(3 \cdot 2 + 5)(3 \cdot 2 + 2)} + \dots + \\ &+ \frac{1}{(3(n-2) + 5)(3(n-2) + 2)} + \frac{1}{(3(n-1) + 5)(3(n-1) + 2)}. \end{aligned}$$

Так как при любом натуральном k выполняется равенство

$$\frac{1}{(3k+5)(3k+2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+5} \right),$$

то

$$\begin{aligned} y_n &= \frac{a}{5} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3 \cdot 1 + 2} - \frac{1}{3 \cdot 1 + 5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3 \cdot 2 + 2} - \frac{1}{3 \cdot 2 + 5} \right) + \dots + \\ &+ \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3(n-2) + 2} - \frac{1}{3(n-2) + 5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3(n-1) + 2} - \frac{1}{3(n-1) + 5} \right) = \\ &= \frac{a}{5} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3 \cdot 1 + 2} - \frac{1}{3(n-1) + 5} \right) = \frac{3a+1}{15} - \frac{1}{3(3n+2)}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$x_n = \frac{(3a+1)(3n+2)}{15} - \frac{1}{3}.$$

Из полученной формулы следует, что последовательность x_n имеет конечный предел в том и только в том случае, когда $3a + 1 = 0$.

Ответ: $-\frac{1}{3}$.

Задача 5. Найти все непрерывно дифференцируемые на числовой прямой \mathbf{R} функции $y(x)$ такие, что

$$y'(x)y(-x) = x \quad \text{и} \quad y(0) = 1.$$

Решение. Пусть функция $y: \mathbf{R} \mapsto \mathbf{R}$ удовлетворяет условию задачи. Тогда при каждом $x \in \mathbf{R}$ имеем

$$(y(x)y(-x))' = y'(x)y(-x) - y(x)y'(-x) = x - (-x) = 2x.$$

Следовательно, $y(x)y(-x) = x^2 + C$. Так как $y(0) = 1$, то $C = 1$. Таким образом, при всех $x \in \mathbf{R}$ выполняется равенство

$$y(x)y(-x) = x^2 + 1.$$

Из последней формулы следует, что $y(x) \neq 0$ при всех $x \in \mathbf{R}$. Для нахождения $y(x)$ составим дифференциальное уравнение

$$\frac{y'(x)y(-x)}{y(x)y(-x)} = \frac{x}{1+x^2} \Leftrightarrow \frac{y'(x)}{y(x)} = \frac{x}{1+x^2}.$$

Интегрируя последнее уравнение (дифференциальное уравнение с разделенными переменными) с учетом условия $y(0) = 1$, получим

$$y(x) = \sqrt{1+x^2}.$$

Непосредственная проверка показывает, что найденная функция удовлетворяет условию задачи.

Ответ: $y(x) = \sqrt{1+x^2}$.

Задача 7. Пусть функция $f: \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \mapsto \mathbf{R}$ — непрерывно дифференцируема и $f(0) = 0$. Доказать неравенство

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f'(x))^2 dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x))^2 dx.$$

Решение. Рассмотрим разность

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f'(x))^2 dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x))^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left((f'(x))^2 + (f(x) \operatorname{ctg} x)^2 - \frac{f^2(x)}{\sin^2 x} \right) dx.$$

Так как

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\cos x} = f'(0),$$

то функции $\frac{f(x)}{\sin x}$ и $f(x) \operatorname{ctg} x = \frac{f(x) \cos x}{\sin x}$ продолжаются по непрерывности на отрезок $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ и

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f'(x))^2 dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x))^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((f'(x))^2 + (f(x) \operatorname{ctg} x)^2) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f^2(x)}{\sin^2 x} dx.$$

Последнее слагаемое полученной формулы проинтегрируем по частям

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f^2(x)}{\sin^2 x} dx &= \left[\begin{array}{l} u = f^2(x) \quad du = 2f(x)f'(x)dx \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \quad v = -\operatorname{ctg} x \end{array} \right] = \\ &= -f^2(x) \operatorname{ctg} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) f'(x) \operatorname{ctg} x dx. \end{aligned}$$

Поскольку $\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} = 0$ и

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^2(x) \operatorname{ctg} x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cos x = f'(0) f(0) \cos 0 = 0,$$

то

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f'(x))^2 dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x))^2 dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((f'(x))^2 + (f(x) \operatorname{ctg} x)^2) dx - \\ &- 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) f'(x) \operatorname{ctg} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f'(x) - f(x) \operatorname{ctg} x)^2 dx \geq 0, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.